

RENSEIGNEMENTS PATIENT

Nom :

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance : Sexe : F M

Adresse :

.....

Téléphone :

N° de sécurité sociale : Mutuelle de l'année en cours :

Adresse mail :

Date du prélèvement : ___/___/___

Heure du prélèvement : ___h___

Lieu du prélèvement :

Laboratoire

Extérieur :

MODALITES DE RENDU DE RESULTATS

Patient : Internet Au labo (bon retrait) A poster

Autre médecin :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES A COMPLETER

Pour une meilleure interprétation de vos résultats, merci de remplir les renseignements ci-dessous

En cas de suspicion de grippe / VRS / coqueluche :

- Date de début des symptômes :

- Date de dernière vaccination :

- Y-a-t-il d'autres cas dans votre entourage ? Oui Non

Prenez-vous un traitement antibiotique, antiviral ou antifongique :

Non

En cours (depuis quand ? : ___/___/___)

A prendre après le prélèvement

A prendre selon les résultats

} lequel ? :

Y a-t-il un contexte particulier ?

- Immunodépression (chimiothérapie ...) ? Oui Non

- Bilan de dépistage (pré-opératoire, médecine du travail) ? Oui Non

- Prélèvement après intervention chirurgicale ? Oui Non

- Autre :

PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE

Réception sur le site : Par : Date : ___/___/___ Heure :

Conformité : OUI NON

Préconisations pour le prélèvement au verso

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT

Gorge / Langue

- Abaisser la langue à l'aide d'un abaisse-langue pour dégager le pharynx, et éviter tout contact salivaire.
- Ecouvillonner les amygdales ou, en leur absence, les piliers du voile du palais.
- En cas d'épiglottite, ne pas réaliser le prélèvement.
- En cas de recherche de mycose oropharyngée, prélever au niveau de la langue, du palais et de la face interne de la joue avec le même écouvillon.

Conduit auditif externe

- Retirer les croûtes présentes dans le conduit auditif externe à l'aide d'un écouvillon fin humidifié.
 - Ecouvillonner le conduit auditif externe avec un autre écouvillon.
- NB : en cas de prélèvement d'oreille moyenne, se référer à un spécialiste.

Prélèvement nasal (dépistage de Staphylocoque doré / SARM)

- Ecouvillonner le tiers inférieur des 2 narines avec un même écouvillon.

Prélèvement nasopharyngé* (recherche Grippe, VRS ou coqueluche)

- Faire moucher le patient.
- Maintenir la tête du patient inclinée en arrière.
- Introduire l'écouvillon dans une narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au plancher de la cavité nasale, jusqu'à la butée.
- Ecouvillonner le nasopharynx en imprimant un léger mouvement rotatif, puis retirer lentement l'écouvillon.

Recherche Herpes*. Localisation :

* Utilisation d'un milieu de transport spécifique (M4RT). Contacter le laboratoire.

Dans tous les cas :

- Identifier chaque prélèvement avec : NOM, Prénom, Date de naissance.
- Noter IMPERATIVEMENT la localisation sur chaque prélèvement.



Faire parvenir rapidement au laboratoire accompagné de la prescription et de cette fiche de renseignements.