laborizon CENTRE — BIOGROUP biologie médicale

FICHE DE PRELEVEMENT ET DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : Hémoculture

B1.SEL.PREL.IMP.014-V02

RENSEIGNEMENTS PATIENT

Nom : …….

Nom de naissance : ……..

Prénom : ……

Date de naissance : …… Sexe : ☐ F ☐ M

Adresse : …….

…….

Téléphone : …….

Date du prélèvement : ___/___/_____

Heure du prélèvement : _____h_____

Lieu du prélèvement :

☐ Laboratoire

☐ Extérieur :

N° de sécurité sociale : ..... Mutuelle de l'année en cours : .....

Adresse mail : ……..

MODALITES DE RENDU DE RESULTATS

Patient : ☐ Internet ☐ Au labo (bon retrait) ☐ A poster

☐ Autre médecin : ……

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES A COMPLETER

Pour une meilleure interprétation de vos résultats, merci de remplir les renseignements ci-dessous

Date, heure et site(s) de ponction à renseigner **IMPERATIVEMENT** directement <u>sur chaque flacon.</u>

Présentez-vous de la fièvre ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, précisez la température :……°C

Prenez-vous un traitement antibiotique ou antifongique ?

☐ Non

☐ En cours (depuis quand ? : __/__/____)

☐ A prendre après le prélèvement

☐ A prendre selon les résultats

} lequel ? :……

Y a-t-il un contexte particulier ?

- Suspicion d'endocardite **☐ Oui** **☐ Non**

(si oui, la durée d'incubation des flacons sera portée à 2 semaines)

- Grossesse ☐ Oui ☐ Non

- Immunodépression (chimiothérapie …) ☐ Oui ☐ Non

PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE

Réception sur le site :……. Par :…… Date : ___ / ___ / _____ Heure :……

Conformité : OUI NON

Préconisations pour le prélèvement au verso

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT

- Se laver les mains. Le port de gants est fortement recommandé.
- Retirer les capsules de protection, puis désinfecter l'opercule et le point de ponction (il est recommandé d'utiliser des antiseptiques alcooliques).
- Ne plus palper la veine après désinfection cutanée.

⚠ Il n'est pas nécessaire d'attendre les pics fébriles ou les frissons pour prélever.

- Lors de la réalisation de l'hémoculture, prélever systématiquement, et successivement, un flacon aérobie, puis un flacon anaérobie (= 1 paire d'hémoculture).
- Bien veiller à prélever 8 à 10 ml de sang par flacon (pour un poids > 40 kg).
  Se référer aux graduations sur les flacons ; ne pas hésiter à marquer sur le flacon, préalablement, la limite minimale et maximale à atteindre.

Volume de sang à mettre en culture en fonction du poids de l'enfant *(Rémic 2018)*

Poids de l'enfant (kg)	Volume de sang à prélever (ml)						Volume total cultivé (ml)	Volume total soustrait (%)
	Paire 1		Paire 2		Paire 3			
	Aérobie	Anaérobie	Aérobie	Anaérobie	Aérobie	Anaérobie		
< ou = 1	0,5 à 2						0,5 à 2	1,5 à 3
1,1-2	1,5 à 4,5						1,5 à 4,5	1,7 à 3
2,1-3,9	3 à 6						3 à 6	1,8
4-7,9	6						6	1 à 2
8-13,9	4 à 5		4 à 5				8 à 10	1 à 1,5
14-18,9	5	5 à 7	5 à 8	5 à 7			20 à 24	1,8 à 2,4
19-25,9	5	5	5	5	5	5	30	1,8 à 2,2
26-39,9	10	10	10	10			40	1,7 à 2,2
> ou = 40	10	10	10	10	10	10	60	< ou = 2,3

- Attention : en cas d'hémocultures différentielles, en périphérie et sur Dispositif Intra Vasculaire (DIV), prélever simultanément une paire sur une veine périphérique et une paire à partir du DIV (cf. protocole de l'établissement si disponible).
- Homogénéiser les prélèvements par retournements successifs.
- Identifier chaque flacon avec : NOM, Prénom, Date de naissance.
- Noter sur chaque flacon : date et heure de prélèvement, site de ponction (périphérique, KT, PAC, PICC line…).
- Remplir la fiche de renseignements cliniques (voir au verso).

Faire parvenir rapidement au laboratoire accompagné de la prescription et de cette fiche de renseignements.

- Conservation : 24h maximum à température ambiante.