

Traitement local = pommade, crème → arrêt 15 jours avant le prélèvement (REMIC 2022)

Nom Commercial	DCI
AMYCOR®	Bifonazole
CLOTRIMAZOLE®	Clotrimazole
PEVARYL®, MYCOAPASYL®	Econazole
LOMEXIN®, TERLOMEXIN®	Fenticonazole
FAZOL®	Isoconazole
KETODERM®, KETOCONAZOLE®	Ketoconazole
FONGAMIL®	Omoconazole
FONX®	Oxiconazole
MONAZOL®, CANDAZOL®	Sertaconazole
TROSYD®	Tioconazole
MYCOSTER®	Ciclopiroxolamine
LAMISIL®, LAMISILATE®	Terbinafine
SPORILINE®, PEDIMYCOSE®	Tolnaftate

Traitement local = Vernis → arrêt 3 mois avant prélèvement (REMIC 2022)

N.B : pour les vernis dits « décoratifs », un arrêt 15 jours avant est souhaitable.

Nom Commercial	DCI
LOCERYL solution filmogène® Loceryl pro, Amorolfine Gé® (vernis) -	Amorolfine
AMYCOR ONYCHOSET® Pommade kératolytique	Bifonazole + urée
MYCOSTER solution filmogène® Onytec, Cyclopyrox Gé® (vernis)	Ciclopirox

Traitements systémiques → arrêt 3 mois avant prélèvement (REMIC 2022)

Nom Commercial	DCI
LAMISIL® FUNGSTER®	Terbinafine
GRISEFULINE® SUSPENDU	Griseofulvine

D'après Revue de Biologie Médicale / N° 358 – janvier-fevrier 2021